

# ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ DN4<sup>1, 2</sup>

**Вопрос 1.** Соответствует ли боль, которую испытывает пациент, одному или нескольким из следующих определений?

1. Ощущение жжения	да	нет
2. Болезненное ощущение холода	да	нет
3. Ощущение, как от ударов током	да	нет

**Вопрос 2.** Сопровождается ли боль одним или несколькими из следующих симптомов в области ее локализации?

4. Пощипывание, ощущение ползания мурашек	да	нет
5. Покалывание	да	нет
6. Онемение	да	нет
7. Зуд	да	нет

**ОСМОТР ПАЦИЕНТА (выявляем аллодинию и негативные сенсорные симптомы)**

**Вопрос 3.** Локализована ли боль в той же области, где осмотр выявляет один или оба из следующих симптомов?

8. Пониженная чувствительность к прикосновению	да	нет
9. Пониженная чувствительность к покалыванию	да	нет

**Вопрос 4.** Можно ли вызвать или усилить боль в области ее локализации?

Сумма баллов (количество ответов «да»):

Ключ (интерпретация): если сумма составляет 4 балла и более, это указывает на то, что боль у пациента является нейропатической или имеется нейропатический компонент боли (при смешанных ноцицептивно-нейропатических болевых синдромах).



**Состав (на один пакет):**  
Действующее вещество —  
глюкозамина сульфат — 1,5  
г

## ЗЕЛЬБОНА®

### ПОРОШОК ГЛЮКОЗАМИНА СУЛЬФАТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Улучшенный состав пероральной формы глюкозамина сульфата с высоким профилем безопасности, не содержит аспартам и макрогол

**Показания к применению:**

остеоартроз периферических суставов  
и позвоночника, остеохондроз.

Способ применения и дозы: внутрь.

Взрослым и детям старше 12 лет: содержа-  
мое одного пакетика растворяют в 200 мл  
воды, принимают внутрь 1 раз в сутки.

Симптоматический эффект наступает через  
2—3 недели после применения препарата.

Курс: минимальный курс терапии составляет  
4—6 недель, при необходимости курс лече-  
ния повторяют с интервалом 2 месяца.

Reg. удостоверение: ЛП-006649

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!  
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!**