

ОПРОСНИК GAD-2^{3*}

Как часто за последние 14 дней Вас беспокоили следующие проблемы?	Ни разу	Несколько дней	Более недели	Почти каждый день
1. Вы нервничали, тревожились, испытывали сильный стресс	0	1	2	3
2. Вы были неспособны успокоиться или контролировать свое волнение	0	1	2	3

* Оценка 3 или выше является сигналом к применению полных шкал PHQ-9 и/или GAD-7 а также означает необходимость полного клинического интервью с пациентом для определения наличия или отсутствия генерализованных тревожных расстройств или депрессии.

1. Методические рекомендации по диагностике и лечению невропатической боли. Под ред. Н. Н. Яхно. М.: Издательство РАМН, 2008; с. 23.
2. Didier Bouhassira et al. Pain. 2005; 114: 29-36.
3. Данилов А. Б., Данилов Ал. Б. Алгоритм мультидоменного скрининга для пациентов с хронической болью в спине, 2020.



ЭЛЬБОНА®

ПОРОШОК ГЛЮКОЗАМИНА СУЛЬФАТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Улучшенный состав пероральной формы глюкозамина сульфата с высоким профилем безопасности, не содержит аспартам и макрогол

Показания к применению:
остеоартроз периферических суставов и позвоночника, остеохондроз.

Способ применения и дозы: внутрь.
Взрослым и детям старше 12 лет: содержимое одного пакетика растворяют в 200 мл воды, принимают внутрь 1 раз в сутки.

Симптоматический эффект наступает через 2—3 недели после применения препарата.
Курс: минимальный курс терапии составляет 4—6 недель, при необходимости курс лечения повторяют с интервалом 2 месяца.

Рег. удостоверение: ЛП-006649

Состав (на один пакет):
Действующее вещество — глюкозамина сульфат — 1,5 г

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ**