

ОПРОСНИК PHQ-2*

Как часто Вас беспокоили любые из следующих симптомов на протяжении последних двух недель?	Не отмечал(а)	Несколько дней	Более половины этого срока	Почти каждый день
1. Снижение интереса или удовольствия в повседневной деятельности	0	1	2	3
2. Снижение настроения, подавленность или безнадежность	0	1	2	3

* Оценка 3 или выше является сигналом к применению полных шкал PHQ-9 и/или GAD-7 а также означает необходимость полного клинического интервью с пациентом для определения наличия или отсутствия генерализованных тревожных расстройств или депрессии.

1. Методические рекомендации по диагностике и лечению невропатической боли. Под ред. Н. Н. Яхно. М.: Издательство РАМН, 2008; с. 23.
2. Didier Bouhassira et al. Pain. 2005; 114: 29-36.
3. Данилов А. Б., Данилов Ал. Б. Алгоритм мультидоменного скрининга для пациентов с хронической болью в спине, 2020.



ЭЛЬБОНА®

ПОРОШОК ГЛЮКОЗАМИНА СУЛЬФАТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Улучшенный состав пероральной формы глюкозамина сульфата с высоким профилем безопасности, не содержит аспартам и макрогол

Показания к применению:
остеоартроз периферических суставов и позвоночника, остеохондроз.

Способ применения и дозы: внутрь.
Взрослым и детям старше 12 лет: содержимое одного пакетика растворяют в 200 мл воды, принимают внутрь 1 раз в сутки.

Симптоматический эффект наступает через 2–3 недели после применения препарата.
Курс: минимальный курс терапии составляет 4–6 недель, при необходимости курс лечения повторяют с интервалом 2 месяца.

Рег. удостоверение: ЛП-006649

Состав (на один пакет):
Действующее вещество — глюкозамина сульфат — 1,5 г

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ